

You Think You Know

# Lo que Necesita Saber

Si usted toma algún medicamento que le dio un amigo, o que compró en la calle, o en las redes sociales, usted corre el riesgo de recibir drogas falsas. Puede que la pastilla contenga sustancias dañinas como el fentanilo, metanfetamina, y cocaína.

Dependiendo de lo que tiene adentro,  
**UNA PASTILLA PUEDE SER MORTAL**

## Mitos Frecuentes

**MITO:** Las drogas recetadas son más seguras que las drogas ilícitas.

**HECHO:** Si la medicina no ha sido recetada para USTED y no viene de una farmacia, entonces no es segura.

**MITO:** Está bien tomar una medicina recetada de un amigo porque lo conozco.

**HECHO:** Incluso si es de una persona a quien conoce usted, usted no sabe de dónde él/ella consiguió la pastilla.

**MITO:** No se puede dar una sobredosis con drogas recetadas.

**HECHO:** Si compra pastillas de una tercera parte o las consigue de un amigo, entonces no sabe de dónde vienen, así que podría contener sustancias como el fentanilo, el cual puede causar una sobredosis.

**MITO:** Se parece de verdad, a lo mejor es de verdad.

**HECHO:** La gente que produce las pastillas falsas se desvive para hacerlas parecer como las de verdad. Sin hacer pruebas de laboratorio, puede ser difícil determinar la diferencia.

**MITO:** Tomar Adderall u otros estimulantes me puede ayudar en sacar mejores notas.

**HECHO:** Las drogas para el ADHD, como Adderall y Ritalin, no mejoran el aprovechamiento académico en los adolescentes quienes no padecen del ADHD, pero sí afecta a su cuerpo y el cerebro.



Traducción financiada por  
Stamford Youth Services



Escanear para  
más recursos

## La apariencias engañan

La única manera de saber si una pastilla contiene una sustancia mortífera es hacerle prueba de laboratorio.



**¡Basta con solamente esta cantidad!**

Esta es una dosis letal de fentanilo.  
No arriesgue su vida para una pastilla.



**YouThinkYouKnowCT.org**

