

# You Think You Know



## ¡Nunca Sabe de Verdad Lo que CUALQUIER Droga Contiene!

El fentanilo fabricado ilícitamente (IMF por sus siglas en inglés) es un opiode sintético 50-100 veces más potente que la morfina y es la primera causa de muerte de las sobredosis fatales en Connecticut.

Las pruebas en laboratorio de la drogas incautadas por los cuerpos policiales demuestran que se puede mezclar el IMF en cualquier sustancia. Como no se puede ver, ni saborear ni oler el IMF no hay ninguna manera de saber si está presente en la sustancia que usted está usando. Es importante entender los peligros del fentanilo y ser preparado cuando sea que está usando una sustancia al saber cómo usar las Pruebas de Tira Reactiva al Fentanilo, entender las indicaciones de una sobredosis, nunca usar a solas, y siempre tener naloxona disponible.

### Tiras Reactivas al Fentanilo

Cómo funcionan:

1. Disuelva una pequeña cantidad de la sustancia en agua.
2. Moje la tira reactiva en el líquido por 15 segundos.

Aunque las pruebas son muy sensibles, es posible que el fentanilo esté presente en otra parte de la sustancia a la cual no hicieron la prueba.

### Indicaciones de una sobredosis

- Las "pupilas puntiformes", pequeñas y contraídas
- Dormirse/Pérdida de la conciencia/cuerpo flácido
- Respiración poca profunda o lenta
- Color de piel ceniciento, pálido o azul
- Ahogo o ruido de gorgoteo

### Las apariencias engañan



AUTÉNTICO

FALSO

### Cómo Responder a Una Sobredosis

1

¡Llame al 911 de inmediato!

2

Adminístrele naloxona (Narcan).

3

Apoya la respiración de la persona.

4

Quédesse con la persona hasta que llegue la ambulancia.



Para obtener más recursos, visite a [YouThinkYouKnowCT.org](http://YouThinkYouKnowCT.org)



Traducción financiada por Stamford Youth Services